




ШЛЯХ ПЕРЕДАЧІ:

- ФЕКАЛЬНО-ОРАЛЬНИЙ**
(забруднені продукти, мухами та тарганами, з водою — якщо каналізаційна та водогінна системи не відповідають сучасним стандартам)



Вірус гепатиту А гине при кип'ятінні (5 хвилин), ультрафіолетовому опроміненні, під дією хлору, в кислому середовищі.

Гепатит А



ПРОФІЛАКТИКА:

- КОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ ВОДОПОСТАЧАННЯ**
- ФОРМУВАННЯ ГІГІЄНІЧНИХ НАВИЧОК** (миття рук),
- ВАКЦИНАЦІЯ**
(медичний персонал інфекційних лікарень, засуджені та персонал виправних закладів.)



ШЛЯХ ПЕРЕДАЧІ:

- З КРОВ'Ю**
(СІН, тату, переливання крові)
- СТАТЕВИЙ**
- ВЕРТИКАЛЬНИЙ**
(від матері до дитини)



Вірус гепатиту В надзвичайно стійкий у зовнішньому середовищі: в крові та її препаратах зберігається роками. Вірус інактивується після автоклавування при 120°C через 45 хвилин, стерилізації сухим жаром при 180°C через 60 хвилин. На нього згубно діють перекис водню, хлорамін, формалін.

Гепатит В



ПРОФІЛАКТИКА:

- ПЛАНОВА ВАКЦИНАЦІЯ**
- ПАРЕНТЕРАЛЬНИЙ ШЛЯХ:**
 - Тестування донорської крові,
 - Впровадження стратегій зниження шкоди
 - Дезінфекція та обмін шприців, замісна терапія
 - Дезінфекція медичного інструментарію
- СТАТЕВИЙ ШЛЯХ:**
 - Уникати незахищених статевих зв'язків,
 - Використовувати якісні презервативи



ШЛЯХ ПЕРЕДАЧІ:

- З КРОВ'Ю**
(СІН, тату, переливання крові)
- СТАТЕВИЙ**
- ВЕРТИКАЛЬНИЙ**
(рідше)



Вірус стійкий до нагрівання до 50°C, інактивується УФО.

Гепатит С



ПРОФІЛАКТИКА:

- ПАРЕНТЕРАЛЬНИЙ ШЛЯХ:**
 - Тестування донорської крові,
 - Впровадження стратегій зниження шкоди
 - Дезінфекція та обмін шприців, замісна терапія
 - Дезінфекція медичного інструментарію
- СТАТЕВИЙ ШЛЯХ:**
 - Уникати незахищених статевих зв'язків,
 - Використовувати якісні презервативи