

ПРОФІЛАКТИКА ТА КОНТРОЛЬ ПОШИРЕННЯ

ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАННІХ СТАДІЯХ ЗАХВОРЮВАННЯ

- Збільшує шанси на повне лікування і перешкоджає зараженню інших осіб.

ВИЯВЛЕННЯ СТАТЕВИХ КОНТАКТІВ ЗАРАЖЕНИХ ОСІБ

- Дозволяє швидко почати лікування партнерів і сприяє встановленню діагнозу, особливо в жінок.

ПРОФІЛАКТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ, ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ РІЗНИМИ МЕТОДАМИ:

САНІТАРНА ОСВІТА

- Знання дозволяють людині змінити свою статеву поведінку та гігієнічні прийоми так, щоб звести до мінімуму можливість зараження і поширення інфекції

МЕХАНІЧНІ СПОСОБИ ПРОФІЛАКТИКИ ВЕНЕРИЧНИХ ХВОРОБ

- Це правильне використання презервативів.

ХІМІЧНІ МЕТОДИ

- Негайне застосування бактерицидних засобів, тобто таких (чи їхніх сполучень), що знищують бактерії перш, ніж ті зможуть проникнути в організм.

ЕКСТРЕНА ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА

**ПІСЛЯ
НЕЗАХИЩЕНОГО
СТАТЕВОГО АКТУ
ЧОЛОВІКАМ
РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ:**



- Випустити сечу та вимити руки з милом;
- Статевий член, мошонку, проміжність вимити з милом;
- Витерти шкіру чистим рушником та протерти тампоном з 0,05% розчином хлоргексідіну або 0,01% розчином мірамістіну;
- Промити уретру 0,05% розчином хлоргексідіну або 0,01% розчином мірамістіну;
- Надягти чисту білизну.

**ПІСЛЯ
НЕЗАХИЩЕНОГО
СТАТЕВОГО АКТУ
ЖІНКАМ
РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ:**

- Випустити сечу та вимити руки з милом;
- Статеві органи вимити з милом;
- Витерти шкіру чистим рушником та протерти тампоном з 0,05% розчином хлоргексідіну або 0,01% розчином мірамістіну;
- Промити піхву 0,05% розчином хлоргексідіну або 0,01% розчином мірамістіну;
- Надягти чисту білизну;
- У випадку орального сексу проводять промивання ротової порожнини, після незахищеного анального необхідно провести промивання прямої кишки 0,05% розчином хлоргексідіну або 0,01% розчином мірамістіну.