

ПРОФІЛАКТИКА ІНФІКУВАННЯ ВІЛ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

Профілактика інфікування ВІЛ на робочому місці


проводиться згідно до клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ – інфекції у дорослих та підлітків 2003 року, затвердженого наказом МОЗ № 580 від 12.12.2003 «Про удосконалення лікування хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД»

Постконтактна профілактика – це короткостроковий курс антиретровірусних препаратів для зниження імовірності розвитку ВІЛ-інфекції після контакту з біологічними рідинами, сполученого з ризиком інфікування ВІЛ.

РИЗИК ІНФІКУВАННЯ

У разі попадання крові та інших біологічних рідин іншої особи в очі, рот — ретельно промити очі, прополоскати рот проточною водою. промити забруднені ділянки шкіри (у тому числі ушкоджені) водою з милом, а забруднені слизові оболонки промити чистою водою, в очі закапати розчин сульфацилу натрію 30%

Негайно звернутися до працівників медичної частини установи для подання невідкладної медичної допомоги і дезінфекції місця травмування, та реєстрації випадку травмування



ПКП антиретровірусними препаратами необхідно почати якомога раніше, найкраще в перші 2 години після контакту, але не пізніше, ніж через 72 години.

ПКП проводиться не менше 30 днів.

Повторне обстеження на ВІЛ проводиться до 90 дня з моменту отримання травми